

deorsum incōuenienter fieri improbabiliter existimare necesse est. Sed an non summa naturæ prouidentia hoc sit; si enim Chylus cum sanguine, cretus cum concocto, æquis portionibus confunderetur, non concoctio transmutatio & sanguificatio exinde proueniret, sed magis (cū inuicem actiua & passiuæ sint) ex alteratorum vnione mistio, & mediū quid, ut in perfusione vini cum aqua & oxirato; iam vero quando multo cum præterlabente sanguine exigua portio Chyli hoc modo admista sit, & quasi nulla notabili proportionē, cōtingit illud facilius (quod ait Aristoteles) cum vna gutta aquæ addita vini dolio, aut è contra, totum non mistum, sed vel vinum vel aqua. Ita in venis meseraicis diffectis, non Chymus, non Chylus & sanguis, aut separati, aut confusi reperiuntur, sed idem qui in reliquis venis sanguis & colore, & consistētia ad sensum apparet. In quo tamen quia Chyli quiddā inconcoctū (licet insensibiliter) inest. Natura iecur apposit, in cuius mæandris moras trahat & pleniorē transmutationem acquirat, ne præmature crudum ad cor perueniens, vitæ principium obrueret. Hinc in Embryone pene nullus vsus iecoris, vnde vena umbilicalis iecur manifeste integra pertransit & à porta iecoris extat foramen vel anastomosis, ut sanguis regrediens ab intestinis fœtus; non per iecur, sed in dictam umbilicalem transiens, cor (vna cum materno sanguine & reuertente à placenta vteri) petat, vnde etiam in prima fœtus conformatione iecur posterius fieri contingit, & nos etiam in fœtu humano obseruauimus perfecte delineata omnia membra, imo genitalia distincta, nondum tamen iecoris posita pene rudimenta. Et sane quousque membra (ut vel cor ipsum in initio) alba omnia apparent, & præterquam in venis ne quidquam ruboris contineant, nihil præter rudem quasi extra venati sanguinis collectionem loco iecoris videbis, quam contusionem quandam vel raptam venam existimares.

Sed in ouo duo quasi vasa umbilicalia, vnum ab albumine integrum pertransiens iecur & ad cor recte tendens, alterum à luteo in venā portam desinens: quippe contingit in ouo pullum primum ex albumine tantum formari & nutriri, à luteo vero post perfectionem & exclusionē (nam & intra intestina in ventre pulli contentum post multos dies ab exclusionē potest luteum reperi, & respondet luteum nutrimento lactis cæterorum animalium, sed hæc conuenientius in obseruationibus circa fœtus formationem, ubi huius generis possunt esse problemata plurima, cur hoc prius factum, aut perfectum sit, illud cur posterius &

de prin-

de principatu membrorum
ca cor plurima, uti cur prin
factum sit: & habere videt
quidquam reliqui corporis
re antea omnia: & qualite
riatq; huc illuc impelli de

Eodē modo in pulsuum
contra & in omnibus ger
plando, quid isti significet

Similiter in Crisibus &
ferim distributione alim

Denique in omni part
otica, Therapeutica, cum
data veritate & luce, qua
mo mecum reputo: camp
curre & latius expatiari a
sceret præter institutum
faciendum deficeret.

Hoc itaq; loco (sequent
da Anatome circa fabric
vsus & causas veras refer
plurima, quæ ex hac veri
rem reddant, reperiuntur
ornatam præ cæteris vel

Est vnum quod licet i
habere deberet, tamen h
A Ramo splenico in pan
coronalis, postica, gustri
culis & ramificationibus
disseminantur. Similiter
lon & longanone vsq
nas vtrinq; sanguis regre
culo, aqueum, tenuem n
terrestriorem, tanquā è
riorū pmistione cōuen
lioris coctionis (pp cōtr
& multa copia calidiori